

Caso clinico : shock cardiogeno in uomo di 48
anni

Uomo di 48 anni, fattori di rischio :
dislipidemia non in trattamento, ex-
fumatore, ipertensione borderline
non in trattamento.

Mentre giocava a tennis: improvvisa
sincope. Trasporto immediato in PS


Nome:
ID:
ID paziente:
Incidente:
Eta: 54

SISTI, DARIO 12 derivazioni I
082709211149 27 Ago 09
PR 0.000s
QT/QTc
Sesso:
Asi: P-QRS-J
aVR

FC 57 bpm
21:18:51
QRS 0.094s
R: 422s/R: 410s
0° - 72° - 67°

•••••••• INFARTO ACUTO ••••••••
• ECG ANORMALE ** Non
confermato **
• RITMO FUNZIONALE (ASSENZA DI ONDA P)
• DEVIAZIONE ASSIALE SINISTRA

• MINIMI CRITERI DI VOLTA
PIU' ESSERE VARIANTE NORM
• INFARTO INFERIORE, EPOC
• LESIONE ANTERO-LATERALE




1-136 x1, 0, 0, 05-40Hz 25mm/sec
MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL

P/N 805319

INDIA 71118 SASSUOLO 3811371-138 80051 ROKG3667P LP1231000141

azione immediata e produttiva







Evoluzione

- Paziente rapidamente estubato
- Rimozione del contropulsatore
- Stabilità clinica
- ECG "normalizzato"
- ECO : normale cinetica
- Dopo una settimana dimissione
- Controllo angio a 6 mesi : persistenza di buon risultato angiografico sul TC
- Terapia antiaggregante : SI
- Terapia con statina: SI